日本 大地震 ·声音

国务院：暂停批核电项目

中国全面检查核设施

国务院总理温家宝16日主持召开国务院常务会议，听取应对日本福岛核电站核泄漏有关情况的汇报。

会议指出，3月11日，日本东北部和关东首都圈发生里氏9级强震，并引发海啸，日本福岛第一核电站发生放射性物质泄漏事故。日方正在采取一切可能的措施缓解事故影响。我国辐射环境监测未发现异常，国内所有运行核电机组处于安全状态。根据国家核事故应急协调委员会专家组分析，福岛核电站目前泄漏的放射性物质经大气和海洋稀释后，不会对我国公众健康造成影响。

会议强调，要充分认识核安全的重要性和紧迫性，核电发展要把安全放在第一位。会议决定：(一)立即组织对我国核设施进行全面安全检查。通过全面细致的安全评估，切实排查安全隐患，采取相关措施，确保绝对安全。(二)切实加强正在运行核设施的安全管理。核设施所在单位要健全制度，严格操作规程，加强运行管理。监管部门要加强监督检查，指导企业及时发现和消除隐患。(三)全面审查在建核电站。要用最先进的标准对所有在建核电站进行安全评估，存在隐患的要坚决整改，不符合安全标准的要立即停止建设。(四)严格审批新上核电项目。抓紧编制核安全规划，调整完善核电发展中长期规划，核安全规划批准前，暂停审批核电项目包括开展前期工作的项目。

会议要求继续加强辐射环境监控预警和重点区域的应急移动监测，及时发布监测情况。加强与日本有关方面合作，积极协助在重灾区的中国公民尽快转移到安全地区。

福岛6个机组最新状况发布

3号情况最危急

日本福岛第一核电站遭地震重创，引发核危机。据16日报道，营运这家核电站的东京电力公司表示，抢救厂内3号反应堆是最高优先，其次是4号反应堆。

以下是这座核电厂内6座反应堆的最新状况：

●1号反应堆12日曾发生爆炸，炉心有熔毁情形，估计燃料棒70%受损。

●2号反应堆15日爆炸，炉心有熔毁情形，燃料棒30%受损。东京电力公司表示，2号反应堆的温度已趋稳定，炉内压力也下降。

●3号反应堆14日曾爆炸，导致屋顶受损，炉心有熔毁情形，昨天冒出白烟。东京电力公司表示，在3号反应堆侦测到该厂历来最高的辐射量。

●4号反应堆继15日爆炸后，昨天又传出起火，情况也不佳，因此东京电力公司列为抢救的第2优先。计划利用推土机清出通往这座反应堆的紧急道路，让消防车通行。

●5号和6号反应堆15日出现温度微升，这两座反应堆先前并未传出问题。东京电力公司表示，正将水灌入这两座反应堆中，以期冷却降温。

最后50个勇士坚守核电站

在日本福岛1号核电站的四座反应堆接连发生重大险情，造成各类放射性物质大量泄漏后，众多救援人员纷纷撤走，但一支人数不多却相当精干的抢险救援队却始终坚守在核反应堆附近工作，成为阻止福岛核电站局面继续恶化的最后一道防线。

据悉，坚守厂区的50名最精干的抢险队员，日本方面没有披露他们的具体名字。这些坚守电站的抢险队员有的是经验丰富的退休老工人，也有的是志愿加入抢险队伍的电站骨干力量。尽管他们身穿最现代化的防护服，但仍不足以抵抗高强度放射线的危害。这些做好慷慨赴死准备的工人为其他救援工作赢得了宝贵的时间。

日本天皇：为了明天好好活着

日本明仁天皇当地时间16日下午通过电视向日本国民发表讲话，他祈祷在这次大地震和海啸后人民平安，并对正在升级的核危机表示关注。

天皇说，余震还在继续，天气也十分的寒冷，一些救灾物资还无法及时送到灾区，灾民们一定十分痛苦，生活一定很艰难，希望大家能够互爱互助，共渡难关。天皇说：“苦难的日子也许还会很长，但是我们不要放弃希望。希望大家保重身体，为了明天好好地活着。”

地震死亡人数增至4164人

日本警察厅16日说，截至当天18时，11日发生的大地震及其引发的海啸已造成4164人死亡、7843人失踪。

据日本时事社报道，日本警察厅说，受灾最严重的宫城县、岩手县和福岛县的死亡人数分别是2207人、1391人和511人。此外，上述三县还分别有2011人、3318人和2507人失踪。



3月16日，日本宫城县仙台市，一个男孩在雪中等候开水泡面。从15日夜间开始，强冷空气袭击日本地震灾区，大部分地区降起了大雪。由于灾区大部分地区断电，有近2000个避难场所没有空调，此外，燃油短缺，煤油取暖器无法使用，加上毛毯不足，灾民生活十分困难。

成年人全身累计受辐射症状

受照剂量	放射病程度	症状
100毫希伏以下	无影响	
100-500毫希伏	轻微影响	白细胞减少，多无症状表现
1000-2000毫希伏	轻度	疲劳、呕吐、食欲减退、暂时性脱发，红细胞减少
2000-4000毫希伏	中度	骨骼和骨密度遭到破坏，红细胞和白细胞数量极度减少，有内出血、呕吐、腹泻症状
4000-6000毫希伏	重度	造血、免疫、生殖系统以及消化道等脏器受影响，甚至危及生命

如何防辐射

衣：及时换衣，肥皂清洗可避免微量辐射 脱掉衣服和鞋子就可以减去9成的外部辐射污染，用肥皂和清水也能洗掉皮肤上的辐射。

食：膳食纤维、海生植物食物或能防辐射 有许多食物成分，比如维生素C、维生素E、胡萝卜素、植物中的多酚化合物甚至多糖等等，“可能有作用”。

住：关闭空调等进风口，用再循环空气 如果要求撤离，注意保持窗户和通风口关闭，使用再循环空气。如果留在室内，关闭空调、换气扇和其他进风口。

行：避免淋雨淋雪，减少身体暴露部位 避免淋雨。尽量减少裸露部位，穿长衣(白色为好)，戴帽子、手套和穿靴子等。脖子(甲状腺)部位尤其重要。

药：含少量碘片预防碘131，要谨慎 对于碘131最普通的做法就去含一些碘片，这样可以预防放射性的碘不会到我们人体的甲状腺，但没事不要乱吃。 星报综合